

When to Keep Your Child Home From School

Coronavirus Infection Disease 2019 (COVID-19)

Children with a positive COVID-19 test or displaying symptoms of COVID-19 should stay home until they have had no fever for 24 hours without use of fever-reducing medication AND improvement of symptoms AND have isolated for the appropriate amount of time as recommended by our local health department.

Chickenpox

Keep child home until they have no new sores for 24 hours AND all sores are dried and crusted. During an outbreak of chickenpox, children who are NOT vaccinated for chickenpox (Varicella) and have been in close contact with someone sick with the infection will not be allowed at school for 21 days after they were last exposed to chickenpox, even if they are not sick.

Diarrhea

Keep child home until seen by a doctor and treated if needed. The school may request a doctor's note to return to school.

Fever

Keep child home with a temperature of 100.4 degrees or higher. Keep child home until fever-free for 24 hours without using fever-reducing medicines such as Motrin and Tylenol. Contact your child's primary care physician and provide a doctor's note for their return to school.

Flu-like symptoms

Sudden onset of fever, chills, muscle aches; may also have vomiting and diarrhea. Keep child home until symptom-free for 24 hours. Contact your child's primary care physician and provide a doctor's note for their return to school.

Head Lice

Keep child home until treatment is completed and no eggs closer than 1/4 inch to the scalp and all live lice are gone.

Vomiting

Keep child home until no vomiting for 24 hours.

Impetigo

Keep child home until treatment has been started. Lesions must be covered while in school.

MRSA

Keep child home if sore is draining, and cannot be covered with a clean, dry bandage. Keep child home if they cannot keep from picking at sore.

Rash

Keep child home until seen by a doctor and treated if needed. The school may request a doctor's note to return to school.

Strep throat

Keep child home until 24 hours after the first dose of antibiotics has been started.

Pink eye

Keep child home until 24 hours after the first dose of antibiotics has been started.

Ringworm

Keep child home until seen by a doctor and until treatment has been started. Area must remain covered at school until completely healed.

Scabies

Keep child home until treatment is completed.

Abdominal Pain

Keep child home with abdominal pain that continues for more than 2 hours.

الأسباب التي تستدعي إبقاء الطفل في البيت و التغيب عن المدرسة

الأمراض المعدية الناجمة عن فيروس كورونا ٢٠١٩ (كوفيد ١٩)-

الأمراض المعدية الناجمة عن فيروس كورونا ٢٠١٩ (كوفيد ١٩)- يجب على الأطفال الذين بينت نتيجة فحوصاتهم إيجابية فيروس كورونا و ظهرت عليهم أعراض كوفيد- ١٩ البقاء في المنزل إلى أن يثبت اختفاء الحمى لمدة ٢٤ ساعة دون استخدام الأدوية الخافضة للحرارة وتحسن الأعراض و مرور ١٠ أيام على الأقل على ظهور الأعراض لأول مرة. يجب أيّ ضاً على الأشقاء وأفراد الأسرة البقاء في المنزل مدة الحجر الصحي الموصى بها.

الجدري

إبقاء الطفل في المنزل إلى حين عدم ظهور قروح جديدة لمدة ٢٤ ساعة و إلى أن تجف جميع القروح و تقتشر. خالئ تقشي جدري الماء، لن يسمح للأطفال الذين لم يتم تطعيمهم لجدري الماء (فارسيال) والذين كانوا على اتصال وثيق مع شخص مريض بالعدوى بالتواجد في المدرسة لمدة ٢١ يوماً بعد تعرضهم لجدري الماء، حتى لو لم يكونوا مرضى.

الإسهال

سانالً في غضون 24 إبقاء الطفل المنزل في حال كون البراز طرياً أو سائلاً، حتى لو لم يكن هناك أي علامات أخرى من المرض الرجاء إبقاء الطفل في البيت حتى مرور 24 ساعة على زوال أعراض الإسهال.

الحمى:

الرجاء إبقاء الطفل في البيت إذا ما كان يعاني من حرارة تصل إلى درجة ١٠٠.٤ فهرنهايت أو أكثر. إبقاء الطفل في البيت لحين زوال الحرارة واستمرار زوالها لمدة ٢٤ ساعة دون استعمال أي أدوية خافضة للحرارة مثل الموترن أو تايلنول. الاتصال بطبيب الطفل و تزويد المدرسة بتقرير طبي مكتوب يفيد بسالمة عودة الطالب إلى المدرسة.

أعراض مشابهة أعراض النفلونزا

ارتفاع حرارة مفاجئ، الشعور بالقشعريرة، ألم في العضلات، الإصابة بالإسهال والقيء من الممكن أيضاً يجب إبقاء الطفل في البيت حتى مرور ٢٤ ساعة على زوال العوارض السابقة دون تناول أي دواء. الاتصال بطبيب الطفل و تزويد المدرسة بتقرير طبي مكتوب يفيد بسالمة عودة الطالب إلى المدرسة.

قمل الرأس

إذا تم اكتشاف القمل للمرة الأولى في المدرسة سوف يسمح للطفل بإكمال اليوم الدراسي لنهايته يجب أن يبقى الطفل في البيت لحين إتمام المعالجة و زوال جميع الحشرات الحية

الحصف (داء جلدي)

يجب إبقاء الطفل في البيت حتى مرور ٢٤ ساعة على بدء الأدوية المضادة للتهاب. يجب تغطية الآفات أثناء وجوده في المدرسة.

عدوى البكتيريا العنقودية المقاومة للمثيلين

يجب أن يبقى الطفل في البيت إذا كانت القروح ملتهبة و متقححة و ال يمكن تغطيتها بالصقة طبية نظيفة و جافة. يجب أن يبقى الطفل في البيت إذا لم يكن بمقدوره التوقف عن حك القروح

الطفح الجلدي

يجب أن يبقى الطفل في البيت لحين مراجعة الطبيب و تلقي العلاج إذا لزم الأمر من الممكن أن تطلب المدرسة تقرير من الطبيب قبل السماح للطفل بالعودة إلى المدرسة

التهاب الحلق

يجب إبقاء الطفل في البيت حتى مرور ٢٤ ساعة على بدء الأدوية المضادة للتهاب.

التهاب باطن العين

يجب إبقاء الطفل في البيت حتى مرور ٢٤ ساعة على تناول الجرعة الأولى من الدواء

القوباء الحلقية مرض جلدي

إبقاء الطفل في المنزل حتى يراه الطبيب وحتى يبدأ العلاج كما يجب أن تبقى المنطقة المصابة مغطاة في المدرسة حتى تلتئم تماماً.

الجرب

يجب أن يبقى الطفل في البيت إلى أن يكتمل العلاج.

القيء

يجب إبقاء الطفل في البيت حتى مرور ٢٤ ساعة عليه دون إقياء.

آلم معوية

إبقاء الطفل في المنزل عند الشعور بآلم في البطن يستمر أكثر من ساعتين.